

CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y ANTIDEPRESIVOS EN PACIENTES DE UNA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA,

J.Reveriego Blanes⁽¹⁾ C.Peña Espinar⁽¹⁾ P.Retamar Gentil⁽¹⁾ M.Rey Rodriguez⁽¹⁾ F.Olmo Montes⁽¹⁾ A.Montilla Burgos⁽¹⁾ F.Guerrero Igea⁽¹⁾ M.Aguayo Canela⁽¹⁾

⁽¹⁾Medicina Interna A. Complejo Hospitalario Virgen Macarena. Sevilla (Sevilla)

OBJETIVOS

Investigar el grado de consumo de tranquilizantes y antidepresivos en pacientes de la consulta de Medicina Interna y su relación con el sexo.

MATERIAL Y METODOS

Estudio de una muestra de pacientes durante 4 meses consecutivos. Variables en estudio: consumo de tranquilizantes, antidepresivos, edad. Estadística: Comparación de variables cualitativas.

RESULTADOS

Se estudió una muestra de 200 pacientes (120 mujeres y 80 hombres). Las mujeres presentaron mayor porcentaje de consumo de tranquilizantes (32% vs 18.5%, $p < 0.02$).

DISCUSIÓN

Se observa un leve aumento del consumo de tranquilizantes en la mujer a partir de los 30 años, intensificandose tras la menopausia.

CONCLUSIONES

El consumo de tranquilizantes y antidepresivos en pacientes de la consulta de Medicina Interna es mayor en la mujer, preferentemente a partir de la menopausia.

TABLA 1. Porcentajes de consumo de tranquilizantes y antidepresivos según el sexo

	HOMBRES	MUJERES	P
EDAD	61.2 +- 15	61.9 +- 14.8	NS
CONSUMO DE TRANQUILIZANTES	18.5 %	32 %	< 0.02
CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS	8.6 %	14.2 %	NS

Relación entre la edad y el consumo de tranquilizantes (mujeres)




TABLA II