

FACTORES CLINICO-EPIDEMIOLOGICOS ASOCIADOS A LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL DE CRÓNICO-PALIATIVOS

J.Conde García⁽¹⁾ F.Guerrero Igea⁽¹⁾ F.Cuesta Lopez⁽¹⁾ V.Morales Caballero de León⁽¹⁾ M.Rey Rodriguez⁽¹⁾
M.Merino Rumín⁽¹⁾ P.Retamar Gentil⁽¹⁾ M.Aguayo Canela⁽¹⁾

⁽¹⁾Medicina Interna A. Hospital Clínico Universitario Virgen Macarena. Sevilla (Sevilla)

OBJETIVOS

Analizar el perfil clínico epidemiológico de los pacientes ingresados con úlceras por presión (upp).

MATERIAL Y METODOS

Diseño transversal, analizando variables tras protocolo estandarizado: edad, sexo, procedencia y patología crónica asociada. Estadística: comparación de porcentajes, chi cuadrado.

RESULTADOS

De un total de 80 pacientes, 18 ingresaron con upp. En este grupo detectamos diferencias significativas en las siguientes variables: mayor porcentaje de procedencia de residencias (50% vs 10%, $p<0.01$), sexo femenino (78% vs 45%, $p<0.01$), demencia senil (72% vs 37%), diabetes (61% vs 32%, $p<0.05$) y enfermos pluripatológicos (56% vs 26%, $p<0.03$)

DISCUSIÓN

En la aparición de las upp intervienen múltiples factores, sin olvidar la falta de movilización y de cambios posturales.

CONCLUSIONES

Los pacientes con upp se asocian al sexo femenino, diabetes, demencia y paciente pluripatológico. Se sugiere que la procedencia de los pacientes pudiera jugar un papel en la aparición de úlceras por presión.



Úlcera sacra en paciente diabética



Úlcera sacra en paciente con demencia senil